

Trois Courlis à bec grêle *Numenius tenuirostris* à Merja Zerga en décembre 1989

Le 19 décembre 1989, nous avons repéré un Courlis à bec grêle dans la partie nord-est de la réserve biologique marocaine de Merja Zerga. Le lendemain, nous en avons vus trois ensemble au même endroit: l'un d'eux, apparemment blessé, sautillait constamment sur une patte en recherchant sa nourriture.

Les Courlis à bec grêle observés accompagnaient en permanence 30 à 50 Courlis cendrés *Numenius arquata*. Vers le milieu du jour, ils stationnaient longuement au nord-est de la lagune, sur le rivage ou sur des petits îlots, près de l'embouchure de l'oued Drader. Lorsqu'ils étaient dérangés, ils s'envolaient et se posaient à grande distance, de l'autre côté de l'oued, grossi par les pluies et infranchissable à pied.

Matin et soir, les deux espèces de courlis venaient se nourrir dans de vastes champs en jachère situés à l'ouest de la forêt d'Eucalyptus qui borde la route reliant Gnafta à Douar El Kaid. Ces champs en pente douce dominant la lagune de plusieurs mètres. Le sol était sec, non labouré et recouvert d'une végétation rase (notamment de Crucifères à fleurs jaunes *Brassicaceae*). Cette zone n'était pas parcourue par le bétail. Les vaches, chevaux et moutons passaient au bord de la lagune sur des terrains humides à végétation rase également, mais plus drue. A part les Courlis, nous n'avons pas observé de limicoles dans les champs. Les autres espèces préférant se nourrir dans les zones plus humides bordant la lagune. Les champs en jachère

parsemés de chaumes et situés entre la route secondaire 216 A et Merja El Mellah étaient également utilisés comme terrain de gagnage par les Courlis cendré et à bec grêle.

Les 18 et 19 décembre, nous avons entendu à plusieurs reprises des coups de feu à Merja El Mellah et observé des paniques collectives parmi les Anatidés et les Limicoles à cet endroit; cet incident est regrettable car Merja Zerga est pratiquement le seul endroit au monde où le Courlis à bec grêle est encore observé régulièrement en hivernage.

Jusqu'ici, les Courlis à bec grêle ont semble-t-il toujours été observés à l'est de la lagune. Comme ils se nourrissent et se reposent aussi dans la zone nord, il serait judicieux d'interdire totalement la chasse à Merja Zerga.

Autres espèces intéressantes observées:

Merja Zerga

-19-12-89, M.M.: 1 *Tringa stagnatilis*, 1 *Sterna caspia*, 5 *Chlidonias hybridus*, 1 *Asio flammeus*.
-20-12-89, H.D. & L.M.: 1 *Elanus caeruleus*, 1 *Asio flammeus*, 5 *Asio capensis*.

Dayet Roureg

-20-12-89, H.D. & L.M.: 1 *Fulica cristata*, 4 *Phalaropus fulicarius*.

Hubert DUPERREX,
Jurigoz 17, CH-1006 Lausanne

Lionel MAUMARY,
Grand'Rue 8, CH-1095 Lutry